

Exercicis proposats

Miquel Angel Perelló

Versió 2001

1. Donats els conjunts següents

$$\begin{aligned}A &= \{x : x = 2n \text{ i } n \in \mathbb{N}\} \\B &= \{x : x = 3n \text{ i } n \in \mathbb{N}\} \\C &= \{x : x = 4n - 1 \text{ i } n \in \mathbb{N}\} \\D &= \{x : x = 4n + 1 \text{ i } n \in \mathbb{N}\}\end{aligned}$$

Troba $A \cap B$, $C \cup D$, $C \cap D$, $\complement A$ i $A \cap (C \cup D)$.

Solució: $A \cap B$ és el conjunt de múltiples de 6, $C \cup D = \{x : x = 2n + 1 \text{ i } n \in \mathbb{N}\}$, $C \cap D = \emptyset$, $\complement A$ és el conjunt dels nombres imparells, i $A \cap (C \cup D) = \emptyset$.

2. Sigui U l'univers dels conjunts A, B i C . Simplifica les següents expressions:

- $(A \cap B) \cup (A \cap \complement B) \cup (\complement A \cap B) \cup (\complement A \cap \complement B)$
- $[(A \cup B) \cap \complement (B \cap \complement A)] \cup [(A \cap B) \cup \complement (B \cup \complement A)]$
- $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup \complement (\complement A \cup \complement B)$
- $(A \cap B) \cup (A \cap \complement B) \cup (\complement A \cap C) \cup (A \cap C)$

Solució: a) U , b) A , c) $A \cap (B \cup C)$ i d) $A \cup C$

3. Si $\#P(A \cup \mathcal{P}(A)) = 8$, calcula $\#A$.

Solució: $\#A = 1$

4. Una empresa ofereix places d'electricista, de mecànic i de fuster. Sabem que 12 persones sol·liciten plaça d'electricista, 12 de mecànic, 15 de fuster, 3 d'electricista i mecànic, 4 de mecànic i fuster, 5 d'electricista i fuster i, finalment, 1 sol·licita plaça de les tres coses. Calcula quanta gent ha fet alguna sol·licitud.

Solució: 28 persones

5. En una reunió hi ha 25 persones que són mèdics, músics o polítics. Hi ha 20 metges, 12 músics i 17 polítics. Hi ha 8 que són mèdics i músics, 12 que són mèdics i polítics i 11 que són músics i polítics. (a) Quants polítics són músics i metges alhora? (b) Quantes persones hi ha amb una sola professió?

Solució: (a) 7 i (b) 8

6. D'un grup de 1000 persones, 950 porten rellotge, 750 porten paraigua, 800 porten corbata i 850 porten barret. Troba el nombre mínim de persones que porten les quatre coses.

Solució: 350

7. Comprova si les següents col·leccions de conjunts formen una partició de \mathbb{N}

- a) $A = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$ i $B = \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$
- b) A és el conjunt dels nombres primers entre si, $B = \{2, 4, 6, 8, 9\}$ i $C = \{x \in \mathbb{N} : x \geq 10\}$
- c) $A = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$ i $C = B = \{5n : n \in \mathbb{N}\}$

Solució: a) Sí, b) No, c) No

8. En el conjunt $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ es defineix la relació

$$x R y \iff y \text{ és múltiple de } x$$

(a) Escribeu el graf de la relació i (b) estudia les seves propietats.

Solució: (a) $R = \left\{ \begin{array}{l} (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 2), \\ (2, 4), (2, 6), (3, 3), (3, 6), (4, 4), (5, 5), (6, 6) \end{array} \right\}$ (b) R és reflexiva, antisimètrica i transitiva.

9. Quina relació binària sobre un conjunt és simètrica i antisimètrica?

Solució: La relació d'igualtat.

10. De les següents relacions, quines són d'equivalència? I en cas de ser-ho, quines són les seves classes?

- a) "Tenir la mateixa altura" en el conjunt dels alumnes d'una classe
- b) "Ser equipol·lent" en el conjunt dels vectors fixos del pla
- c) "Equidistar d'un punt fix donat" en el conjunt dels punts del pla
- d) "Estar alineats amb un punt fix donat" en el conjunt de parells de punts del pla sense el punt fix donat

Solució: (a) És d'equivalència i els alumnes queden classificats segons les seves altures (b) És d'equivalència i les classes són els vectors lliures del pla (c) És d'equivalència i les classes són les circumferències de centre el punt fix donat (d) És d'equivalència i les classes són les rectes que passen pel punt fix donat sense contenir aquest punt.

11. En el conjunt dels nombres reals es defineix la relació

$$x \sim y \iff [x] = [y]$$

on $[y]$ significa la part sencera del nombre real x . És una relació d'equivalència? Si ho és, quines són les seves classes?

Solució: Observa que $x \sim y$ si i només si existeix un nombre enter n tal que $x, y \in [n, n + 1)$. És una relació d'equivalència i les classes són els intervals de la forma $[n, n + 1)$ amb $n \in \mathbb{Z}$.

12. Esbrina si la relació " x divideix y " és d'ordre en cadascun dels conjunts que s'indiquen a continuació, i, en el cas que ho sigui, és parcial o total? Troba els seus elements maximals i minimalis.

- a) En el conjunt dels nombres naturals \mathbb{N}
- b) En el conjunt dels nombres enters \mathbb{Z}

Solució: (a) És d'ordre parcial, 1 és minimal i no hi ha elements maximals.
 (b) No és d'ordre

13. En el conjunt dels nombres reals ordenat segons la relació d'ordre usual \leq es consideren els següents subconjunts (a) $A = [1, 5]$, (b) $B = (-2, -1]$, (c) $C = (\pi, 2\pi)$, (d) $D = [2, +\infty)$, (e) $E = (-5, +\infty)$ i (f) $F = (-\infty, 0)$. Calcula, si existeixen, mínim, màxim, ínfim i suprem de cadascun d'ells.

Solució: (a) $\min A = \inf A = 1$ i $\max A = \sup A = 5$, (b) $\inf B = -2$ i $\max B = \sup B = -1$, (c) $\inf C = \pi$ i $\sup C = 2\pi$, (d) $\min D = \inf D = 2$, (e) $\inf E = -5$, (f) $\sup F = 0$

14. En el conjunt $A = \{2, 3, 5, 6, 15\}$ es defineix la relació

$$x R y \iff y \text{ és múltiple de } x$$

(a) És una relació d'ordre? És parcial o total? (b) Troba màxim, mínim, suprem i ínfim de $B = \{2, 3, 6, 15\}$. (c) Troba màxim, mínim, suprem i ínfim de A . (d) Hi ha elements maximals i minimalis d' A ?

Solució: (a) És d'ordre parcial (b) No existeixen $\max B$, $\min B$, $\sup B$, $\inf B$. (c) No existeixen $\max A$, $\min A$, $\sup A$, $\inf A$. (d) 2, 3, 5 són minimalis i 6, 15 són maximals.

15. Es donen els conjunts $A = \{2, 3, 4, 7, 8\}$ i $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\}$. Sigui $f : A \rightarrow B$ l'aplicació definida per

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} & \text{si } x \text{ és parell} \\ x & \text{si } x \text{ és senar} \end{cases}$$

Estudia quina classe d'aplicació s'obté.

Solució: És una aplicació injectiva

16. Donades les aplicacions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = e^x$ i $g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $g(x) = \sqrt{x}$. (a) De quina classe d'aplicacions són f i g ? (b) Canvia els conjunts de sortida i d'arribada de l'aplicació f perquè sigui bijectiva. (c) Canvia els conjunts de sortida i d'arribada de l'aplicació g perquè sigui bijectiva. (d) Calcula les aplicacions inverses de les aplicacions de l'apartat (c). (e) Calcula si és possible $f \circ g$ i $g \circ f$.

Solució: (a) f és injectiva però no exhaustiva i g és injectiva però no exhaustiva. (b) L'aplicació $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ definida per $f(x) = e^x$ és bijectiva. (c) L'aplicació $g : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ definida per $g(x) = \sqrt{x}$ és bijectiva. (d) $f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ amb $f^{-1}(x) = \ln x$ i $g^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ amb $g^{-1}(x) = x^2$. (e) $f \circ g : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ amb $(f \circ g)(x) = e^{\sqrt{x}}$ i $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ amb $(g \circ f)(x) = \sqrt{e^x}$ ja que $\text{Im } f = (0, +\infty) \subset [0, +\infty)$.

17. Donada l'aplicació $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida per $f(x) = 2x + 1$, calcula $f(A)$ i $f^{-1}(A)$ en els casos següents: (a) $A = [1, 3]$, (b) $A = [-2, -1)$, (c) $A = [1, +\infty)$ i (d) $A = (-\infty, -2)$.

Solució: (a) $f(A) = [3, 7]$ i $f^{-1}(A) = [0, 1]$, (b) $f(A) = [-3 - 1]$ i $f^{-1}(A) = [-3/2, -1]$, (c) $f(A) = [3, +\infty)$ i $f^{-1}(A) = [0, +\infty)$ i (d) $f(A) = (-\infty, -3)$ i $f^{-1}(A) = (-\infty, -3/2)$.

18. Sigui $f : \mathbb{R} - \{1\} \longrightarrow \mathbb{R} - \{3\}$ definida per

$$f(x) = \frac{3x - 1}{x - 1}$$

Demostra que és bijectiva i calcula l'aplicació inversa.

Solució: Cal demostrar que és injectiva i exhaustiva. L'aplicació inversa és

$$f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{x - 3}$$